

Date du prélèvement :
Heure :
Préleveur :
Réceptionné le :
Heure :
Site de réception :
☐ Prélèvement non conforme

Nom : Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance (Impératif) :
ADRESSE : Tel :

Modalités de prélèvement :

☐ Auto-prélèvement ☐ Vaginal ☐ Endocervical ☐ Vulvaire

Délai d'acheminement

- **Acheminer dès que possible au laboratoire le prélèvement identifié dans un délai inférieur à 24h à température ambiante.**

Renseignements cliniques à fournir

SYMPTOMES évocateurs d'infection génitale

Démangeaisons ☐ Fièvre ☐ Douleurs abdominales ☐
Brûlures ☐ Troubles urinaires ☐ Saignements (hors règles) ☐

Pertes vaginales

Blanches épaisses ☐
Verdâtres ☐
Mousseuses ☐
Malodorantes ☐
Autres ☐

☐ Autres symptômes (A décrire)

.....
.....
.....

GROSSESSE

- ☐ en cours (date de début de grossesse.....)
☐ **Accouchement** datant de moins de 2 mois (Date)
☐ Menace d'accouchement prématuré

 **Ménopause** ☐

SI ABSENCE DE SYMPTOME

Contexte :

- ☐ Dépistage IST (maladie sexuellement transmissible)
☐ Contrôle IST après traitement. Quelle IST ?
☐ Partenaire testé Mycoplasma genitalium +
☐ Autre :

TRAITEMENT

Antibiotiques :

- ☐ Pris récemment (< 3mois) Nom de l'atb. :
☐ Allergie Amoxicilline

Traitement antifongique pris récemment (<15j) :

- ☐ Ovule ☐ crème

contraception

- ☐ Pilule ☐ Stérilet

Protocole d'auto-prélèvement :

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.

- 1- Poser le tube contenant le liquide pour qu'il soit stable.
- 2- Saisir l'écouvillon et le tenir comme le montre la figure 1, en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige.
- 3- Introduire délicatement l'écouvillon dans le vagin (min 5cm) (cf. figure 2), et tourner doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes en s'assurant qu'il touche les parois (internes) du vagin.
- 4- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 5- Pendant que vous tenez l'écouvillon, dévisser le bouchon du tube. Veiller à ne pas renverser le contenu du tube.
(Si cela arrive, redemander un nouveau kit de prélèvement).
- 6- Placer l'écouvillon dans le liquide et casser la tige en la pliant sur le bord au niveau du trait rouge comme le montre la figure 3.
- 7- Refermer le tube en vissant fermement le bouchon (cf. figure 4).
- 8- **Identifier** le prélèvement avec vos Nom, prénom et date de naissance.

Ne pas toucher la zone située sous le trait coloré (risque de contamination)




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4